

2020年8月14日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勘
副委員長 山川 智之
副委員長 竜崎 崇和
副委員長 南学 正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者数

(2020年8月14日午前8時 時点)

時点	地区	北海道・東北地区	関東地区 (東京都を除く)	東京地区	甲信越・北陸・東海地区	近畿地区	中国・四国地区	九州・沖縄地区	合計
		6/5	感染者数	1	24	35	12	21	0
	死者数	0	5	7	3	3	0	0	18
6/12	感染者数	1	24	35	14	21	0	13	108
	死者数	0	5	8	3	3	0	0	19
6/19	感染者数	4	24	36	14	21	0	13	112
	死者数	0	5	9	3	3	0	0	20
6/26	感染者数	4	24	36	14	21	0	13	112
	死者数	0	5	9	3	3	0	0	20
7/3	感染者数	4	26	38	14	21	0	13	116
	死者数	0	6	10	3	3	0	0	22
7/10	感染者数	4	26	39	14	22	0	15	120
	死者数	0	6	10	3	3	0	0	22
7/17	感染者数	4	27	41	14	22	0	17	125
	死者数	0	6	10	3	3	0	0	22
7/24	感染者数	4	29	43	14	23	0	17	130
	死者数	0	6	10	3	3	0	0	22
7/31	感染者数	4	33	45	16	24	0	20	142
	死者数	0	6	10	3	3	0	0	22
8/7	感染者数	4	36	57	17	25	1	20	160
	死者数	0	6	11	3	3	0	0	23
8/14	感染者数	4	43	63	17	40	1	21	189
	転帰不明数 (入院中含む)	0	22	30	8	24	1	8	93
	死者数	0	7	12	3	4	0	0	26

北海道・東北地区 (北海道, 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 山形, 福島)
 関東地区(東京都を除く) (茨城, 栃木, 群馬, 埼玉, 千葉, 神奈川)
 東京地区 (東京都のみ)
 甲信越・北陸・東海地区 (新潟, 富山, 石川, 福井, 山梨, 長野, 岐阜, 静岡, 愛知, 三重)
 近畿地区 (滋賀, 京都, 大阪, 兵庫, 奈良, 和歌山)
 中国・四国地区 (鳥取, 島根, 岡山, 広島, 山口, 徳島, 香川, 愛媛, 高知)
 九州・沖縄地区 (福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島, 沖縄)

県ごとやもう少し地域を絞った公表を望む意見をいただいたが、まだ COVID-19 の発生が少ない地域では、施設などを同定される可能性があることから、現段階では東京以外は広い地域での公表としている。

なお、患者の詳細情報は次ページ参照。詳細情報は集積であり、人工呼吸器や ECMO を離脱した患者も使用既往があれば、人数に記載している。

患者詳細情報

転帰	退院	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数	70	26	93	189

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	2	22	31	45	49	36	4	189
死亡者数	0	0	2	5	12	7	0	26
死亡率(%)	0	0	6.5	11.1	24.5	19.4	0	13.8

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数	128	57	4	189

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数	30	47	46	22	12	15	17	189

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明	情報なし	全体
患者数	73	36	20	26	18	16	189

症状	あり	なし	不明	情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	146	24	2	17	189
咳嗽	92	72	8	17	189
咽頭痛	30	120	17	22	189
頭痛	26	125	17	21	189
鼻汁	33	117	17	22	189
嘔気・嘔吐	15	142	13	19	189
下痢	27	129	13	20	189
嗅覚味覚異常	17	118	33	21	189

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	79	40	39	31	189
胸部CT	105	14	41	29	189

酸素投与	あり	なし	不明	情報なし	全体
酸素投与の必要	64	96	6	23	189
呼吸機器の必要	23	131	12	23	189
ECMOの必要	3	148	14	24	189

治療薬	あり	なし	不明	情報なし	全体
アピガン	62	82	12	33	189
ブラケニル	14	129	12	34	189
レムデシビル	1	141	12	35	189
カレトラ	6	136	12	35	189
オルベスコ	37	107	11	34	189
デカドロン	9	134	12	34	189

透析患者における新規感染者数も急速に増加しております。7月31日に142人でしたが、8月14日には189人と、この2週間で47人もの患者が発生して、発生スピードがこれまでの5倍近くになっており、数か所の施設で集団感染事例が報告されております。

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会・新型コロナウイルス感染対合同委員会(HPより一部抜粋)

透析患者さんへ

マスク・手洗い・うがい・3密を忘れないで、そして熱中症にも、気を付けて下さい。

岐腎協 高田