

2021年7月16日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会  
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤  
副委員長 山川智之  
副委員長 竜崎崇和  
副委員長 南学正臣

## 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年7月15日16時 時点)

時点 患者数 地区	6/3	6/10	6/17	6/24	7/1	7/8	7/15		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	131	140	142	156	158	158	158	15	72
東北	32	32	32	32	32	32	32	15	9
北関東	61	61	64	64	65	65	65	41	9
南関東 (東京除く)	359	362	367	372	376	379	380	184	68
東京	465	467	469	472	474	480	487	231	58
甲信越・北陸	31	31	31	33	34	37	37	10	7
東海 (愛知除く)	66	67	67	68	71	71	71	26	20
愛知	96	99	99	103	104	105	105	46	13
近畿 (大阪除く)	141	148	152	152	153	153	153	92	19
大阪	193	205	207	209	215	215	216	80	26
中国	65	70	72	78	79	81	82	23	7
四国	14	14	14	14	14	14	14	8	2
九州・沖縄 (福岡除く)	64	64	65	65	66	66	68	38	6
福岡	142	145	145	145	146	147	148	96	29
合計	1860	1905	1926	1963	1987	2003	2016	905	345

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島  
北関東 茨城・栃木・群馬  
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川  
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野  
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重  
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山  
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口  
四国 徳島・香川・愛媛・高知  
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

## 患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	766	345	905	2016
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	21	4	3	28

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	23	5

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	32	177	304	416	531	447	109	2016
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	5	7	8	3	4	0	28
転帰不明者数(入院中含む)	13	64	132	192	233	172	99	905
死亡者数	0	11	21	50	113	144	6	345
致死率(%)	0.0	6.2	6.9	12.0	21.3	32.2	5.5	17.1
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	9.7	12.2	22.3	37.9	52.4	60.0	31.1

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1328	570	118	2016
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	21	7	0	28

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	213	610	438	218	101	129	307	2016
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	7	16	5	0	0	0	0	28

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	834	296	230	228	428	2016
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	9	8	2	6	3	28

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1412	314	290	2016
咳嗽	908	769	339	2016
咽頭痛	305	1256	455	2016
頭痛	178	1373	465	2016
鼻汁	237	1342	437	2016
嘔気・嘔吐	147	1454	415	2016
下痢	198	1419	399	2016
嗅覚味覚異常	107	1311	598	2016

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	660	351	609	396	2016
胸部CT	908	180	557	371	2016

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	701	887	428	2016
呼吸機器の有無	177	1341	498	2016
ECMOの有無	11	1488	517	2016

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	177	1262	577	2016
デキサメタゾン(デカドロン)	591	851	574	2016
トシリズマブ(アクテムラ)	58	1382	576	2016
ファビピラビル(アビガン)	391	1049	576	2016
シクレソニド(オルベスコ)	129	1306	581	2016

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	40	48	64	247	399
患者数(酸素投与あり)	9	8	17	27	61

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	8	31	64	107	113	323

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	28	178	122	26	2	356

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	18	127	131	54	28	358

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	102	126	75	40	34	377

白血球数(/ $\mu$ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	35	322	26	4	2	389

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	37	43	98	101	104	383

血小板数(万/ $\mu$ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	75	233	63	9	6	386